



Calendario de vacunación

Para proteger a nuestros amados hijos de las EPV(Enfermedades Prevenibles por Vacunación), es necesario que, cuando cumpla la edad de vacunación, se le aplique la vacuna en el momento más oportuno posible. Es importante que reciba la vacuna sin falta. Este calendario es una propuesta de la organización sin fines de lucro "KNOW★VPD! Protect Our Children" (¡Conoce las EPV! Protejamos a nuestros niños) para formar la inmunización lo antes posible. Programe la vacunación de sus hijos consultando con su médico de cabecera, considerando los métodos de vacunación según la comunidad y la situación de propagación de las EVP.

Nombre de la vacuna	Ya vacunada	0 año	1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	1 año	1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	2 años	3 años	4 años	5 años	6 años	7 años	8 años	9 años	10 años	11 años	12 años	13 años	(Edad cumplida)																		
Vacuna ARNm COVID-19	Especial	<input type="checkbox"/>	El calendario de vacunación puede ser modificado. Verifique previamente la información actualizada.																											Normalmente, la segunda dosis se aplica luego de 3 semanas de la primera, y la tercera dosis se aplica luego de 8 semanas de la segunda.																										
Vacuna inactivada Hepatitis B (excepto la prevención del contagio de madre a hijo)	Regular	<input type="checkbox"/>	Es necesario recibir 3 dosis de la vacuna antes de cumplir 1 año. La tercera dosis se debe aplicar con un intervalo de entre 4 y 5 meses desde la segunda. En caso de no haberse vacunado, a pesar de tener más de 1 año, se recomienda vacunar cuanto antes. (Vacunación opcional)																											Generalmente se reciben 2 dosis con un intervalo de 3 semanas (primera vacunación). Para vacunaciones adicionales, abrir un periodo de al menos 3 meses de la vacunación anterior.																										
Vacuna viva atenuada Rotavirus (Vacuna oral)	Regular	<input type="checkbox"/>	En la vacuna contra el rotavirus, hay vacunas de 1 cepa y de 5 cepas. Comenzar la vacunación hasta las 14 semanas y 6 días de haber nacido, a más tardar, y aplicar la cantidad de dosis necesarias para cada tipo.																																																					
Vacuna inactivada Hib	Regular	<input type="checkbox"/>	Para completar a tiempo la cantidad de vacunas necesarias contra el rotavirus, Hib, neumococo y la vacuna cuádruple, es importante la vacunación simultánea.																											Se aplica la vacuna DPT 1 vez para prevenir la infección de la tosferina. (Vacunación opcional) La OMS también recomienda la vacunación del refuerzo en este periodo.																										
Vacuna inactivada Neumococo	Regular	<input type="checkbox"/>																												Doble (DT): refuerzo a los 11 años (Edad de vacunación: 11 a 12 años)																										
Vacuna inactivada Cuádruple (DPT-IPV) Triple (DPT) y polio (IPV)	Regular	<input type="checkbox"/>																																																						
Vacuna viva atenuada BCG	Regular	<input type="checkbox"/>	Cuando cumpla 1 año, aplique la vacunación simultánea. Puede recibir la vacunación simultánea de hasta 6 vacunas: Hib, neumococo, cuádruple, MR, varicela y paperas.																											En el extranjero, es común recibir la vacuna antipoliomielítica desde los 4 años en adelante. (Vacunación opcional)																										
Vacuna viva atenuada MR (sarampión, rubeola)	Regular	<input type="checkbox"/>																												En el extranjero, es común recibir la vacuna triple. (Vacunación opcional)																										
Vacuna viva atenuada Varicela	Regular	<input type="checkbox"/>																												Se recomienda la vacunación de abril a junio del último año de preescolar.																										
Vacuna viva atenuada Paperas	Opcional	<input type="checkbox"/>																												Si no ha contraído la infección, vacunarse 2 veces. (*)																										
Vacuna inactivada Encefalitis japonesa	Regular	<input type="checkbox"/>	Normalmente se vacuna desde los 3 años, pero puede aplicarse desde los 6 meses de edad.																																																					
Vacuna inactivada Gripe (influenza)	Opcional	Cada otoño	Vacunarse todos los años, aproximadamente de octubre a noviembre.																											Refuerzo a los 9 años. (Edad de vacunación: 9 a 12 años)																										
Vacuna inactivada VPH (bivalente, cuadrivalente, nonavalente) (virus del papiloma humano)	Regular	<input type="checkbox"/>	Los varones pueden recibir la vacuna cuadrivalente. (Vacunación opcional)																											En el caso de la vacuna nonavalente, si la primera vacunación se realiza antes de cumplir los 15 años, se aplican 2 o 3 dosis. Si tiene 15 años o más, se aplican 3 dosis.																										
Vacuna inactivada Meningococo	Opcional	<input type="checkbox"/>	Puede vacunarse desde los 2 años. Se recomienda que las personas que vayan a estudiar al extranjero o vivir en residencias estudiantiles se vacunen.																											Aplicar la vacuna cuando pase a sexto grado de la escuela primaria. (Edad de vacunación regular: niñas desde sexto grado de la escuela primaria hasta primer año de la escuela secundaria superior)																										
Vacunas para viajeros	<input type="checkbox"/>	En las vacunas para viajeros, además de las mencionadas, hay casos que requerirá la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, hepatitis A, rabia, etc. Cuando tenga decidido viajar al exterior, consulte sobre la vacunación lo antes posible a una clínica del viajero, etc.																																																						

Vacuna ARNm Vacuna ARNm	Especial Gratis (monto total bajo carga de expensas públicas).	Edad de vacunación especial	↔ Período sugerido de vacunación (los números indican la cantidad de dosis)	(*) No descrito en el documento adjunto, pero se recomienda la vacunación
Vacuna inactivada Vacuna inactivada	Regular En caso de vacunarse dentro del período determinado, por regla general, son gratis (carga de expensas públicas).	Edad de vacunación regular	↔ Período de vacunación sugerido no descrito en el documento adjunto	
Vacuna viva atenuada Vacuna viva atenuada	Opcional La mayoría son a costo propio (carga personal). Algunos municipios otorgan subsidios. Las vacunas opcionales son igualmente necesarias que las vacunas regulares.	Edad de vacunación optativa		

• Para la inyección de vacunas vivas atenuadas de diferentes tipos se requiere abrir un período de al menos 4 semanas entre sí. (Podrá recibir la vacuna desde el mismo día de la semana luego de 4 semanas.)

Para más información: <https://www.know-vpd.jp/> **VPD** **Buscar**