

# LỊCH TIÊM CHỦNG

Để bảo vệ các con yêu thương khỏi những căn bệnh có thể phòng ngừa bằng các loại vắc xin (VPD) thì điều quan trọng là bạn hãy nhớ cho trẻ đi tiêm phòng đúng độ tuổi, đúng lịch. Lịch tiêm chủng này là một đề án của Tổ chức phi lợi nhuận KNOW-VPD (Hiệp hội hiểu biết về bệnh phòng chống bằng vắc xin và bảo vệ trẻ em) nhằm sớm tạo hệ miễn dịch cho trẻ. Về lịch tiêm chủng dự phòng cho trẻ, tùy theo phương pháp tiêm phòng của từng khu vực và tình trạng lây lan của các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin, hãy trao đổi với bác sĩ phụ trách để lên lịch tiêm chủng.

Tên vắc xin		Đã tiêm chủng	Độ tuổi (tính tròn năm)													
		<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Corona chủng mới	Tạm thời	Lịch tiêm chủng có thể thay đổi. Hãy kiểm tra trước thông tin mới nhất.													
	Vắc xin ngừa viêm gan B (Ngoại trừ trường hợp tiêm phòng lây nhiễm giữa mẹ và con)	Định kỳ	Cần tiêm 3 lần khi trẻ dưới 1 tuổi. Lần tiêm thứ 3 cách lần tiêm thứ 2 từ 4-5 tháng. Nếu từ 1 tuổi trở lên mà chưa tiêm thì nên tiêm càng sớm càng tốt. (Tiêm chủng tự nguyện)													
	Vắc xin phòng ngừa vi rút Rota (Vắc xin dạng uống)	Định kỳ	Có 2 loại vắc xin phòng siêu vi trùng Rota là vắc xin 1 giá (monovalent) và vắc xin 5 giá (pentavalent). Bắt đầu tiêm chậm nhất là đến 14 tuần 6 ngày sau khi sinh, cho trẻ tiêm số mũi cần thiết của từng loại.													
	Vắc xin phòng Hib	Định kỳ	Quan trọng là phải thực hiện tiêm đồng thời để nhanh chóng tiêm đủ số lần cần thiết của vắc xin phòng vi rút Rota, Hib, vắc xin phế cầu khuẩn ở trẻ, vắc xin hỗn hợp 4 loại.													
	Vắc xin phế cầu khuẩn ở trẻ em	Định kỳ	Tiêm 1 lần vắc xin hỗn hợp 3 loại để phòng lây nhiễm ho gà. (Tiêm chủng tự nguyện) Tổ chức y tế thế giới WHO cũng khuyến nghị tiêm chủng bổ sung vào thời kỳ này.													
	Vắc xin hỗn hợp 4 loại (DPT-IPV) Vắc xin hỗn hợp 3 loại, vắc xin phòng bại liệt	Định kỳ	Sau sinh nhật 1 tuổi thì hãy thực hiện tiêm chủng đồng thời. Có thể tiêm chủng đồng thời 6 mũi tiêm phòng gồm vắc xin ngăn ngừa Hib, phế cầu khuẩn ở trẻ em, tiêm chủng hỗn hợp 4 loại, MR (sởi-rubella), thủy đậu, quai bị.													
	Vắc xin BCG (phòng lao)	Định kỳ	Ở nước ngoài, thông thường trẻ trên 4 tuổi sẽ được tiêm vắc xin phòng bại liệt. (Tiêm chủng tự nguyện)													
	Vắc xin MR (Vắc xin phối hợp sởi - rubella)	Định kỳ	Ở nước ngoài, thông thường sẽ tiêm vắc xin hỗn hợp 3 loại. (Tiêm chủng tự nguyện)													
	Vắc xin phòng thủy đậu	Định kỳ	Khuyến khích cho trẻ đăng học năm cuối mẫu giáo hoặc nhà trẻ; vào tháng 4 đến tháng 6.													
	Vắc xin phòng quai bị	Tự nguyện	Trẻ chưa từng mắc quai bị thì nên tiêm 2 lần. (*)													
	Vắc xin viêm não Nhật Bản	Định kỳ	Theo tiêu chuẩn thì từ 3 tuổi trở lên trẻ có thể tiêm phòng, nhưng từ 6 tháng tuổi trở lên trẻ cũng có thể tiêm được.													
	Vắc xin phòng bệnh cúm	Tự nguyện	Mùa thu hàng năm. Hãy tiêm vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 trong năm.													
	Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung 2 giá, 4 giá, 9 giá (Virut Human papilloma/HPV)	Định kỳ	Con trai sẽ được tiêm vắc xin 4 giá (tiêm tự nguyện). Về vắc xin 9 giá, đối với trẻ dưới 15 tuổi tại thời điểm tiêm vắc xin lần đầu, khuyến nghị là 2 hoặc 3 lần. Nếu bắt đầu từ 15 tuổi trở lên thì khuyến nghị là 3 lần.													
	Vắc xin phòng viêm não mô cầu	Tự nguyện	Có thể tiêm từ năm 2 tuổi. Khuyến nghị tiêm đối với người đi du học nước ngoài hoặc sống trong kí túc xá.													
Vắc xin du lịch			Ngoài các loại vắc xin kể trên, trẻ có thể phải tiêm phòng các bệnh như sốt vàng da, viêm gan A và bệnh dại khi đi ra nước ngoài. Nếu bạn quyết định đi ra nước ngoài, hãy xin tư vấn về chúng ngừa tại phòng khám du lịch càng sớm càng tốt.													

Vắc xin mRNA: Miễn phí (toàn bộ chi phí phải trả)

Vắc xin bất hoạt: Về nguyên tắc, trường hợp tiêm trong khoảng thời gian được khuyến khích thì miễn phí (Chi phí do nhà nước chi trả)

Vắc xin sống: Đa phần là mất phí (tự chi trả). Tùy theo nhóm tự mà có thể được hỗ trợ chi phí. Các mũi tiêm chủng vắc xin tự nguyện cần thiết không kèm các mũi tiêm chủng vắc xin định kỳ.

Tiêm chủng đồng thời: Có thể cùng lúc tiêm chủng nhiều loại vắc xin khác nhau. Tiêm chủng đồng thời cũng an toàn như khi tiêm chủng đơn lẻ từng loại vắc xin. Chính phủ và Hiệp hội nhi khoa Nhật Bản đều khuyến khích tiêm vào vùng đùi. (Phần phía trước ngoài của bắp đùi) Hãy xin tư vấn chi tiết từ bác sĩ phụ trách.

Độ tuổi được tiêm chủng tạm thời

  Độ tuổi được tiêm chủng định kỳ

  Độ tuổi có thể tiêm chủng tự nguyện

Thời kì tiêm chủng được khuyến khích (Chữ số là số lần tiêm chủng)

Thời kì tiêm chủng được khuyến khích không ghi trong văn bản đi kèm

Không ghi trong văn bản đi kèm nhưng khuyến khích tiêm phòng

Khoảng cách tiêm chủng gần nhất để tiêm các loại khác nhau giữa các loại vắc xin sống là 4 tuần (có thể tiêm cùng ngày trong tuần 4 tuần sau).

Thông tin chi tiết tại: <https://www.know-vpd.jp/> VPD Tìm kiếm