

টিকাদানের সময়সূচী

আপনার সন্তানদের VPD (টিকা দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব রোগ) থেকে রক্ষা করার জন্য, টিকা দানের সময়সূচী মনে রেখে যথাসম্ভব সঠিক সময়ে টিকা প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। শিশু-প্রতিরক্ষা সমিতির মতনুসারে VPD (অনুমোদিত NPO) সম্পর্কে জানা এবং সঠিক সময়ে টিকাদান করা হলে জন্মের প্রথম দিকেই বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে শিশুকে সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব। তাই, সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সাথে এলাকা ভিত্তিক টিকা দান পদ্ধতি এবং VPD এর মহামারী পরিস্থিতি বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করে আপনার শিশুকে টিকাদানের একটি সময়সূচী নির্ধারণ করুন।

টিকা বা ভ্যাকসিনের নাম	টিকাদান সম্পন্ন হয়েছে	০ বছর	১ মাস	২ মাস	৩ মাস	৪ মাস	৫ মাস	৬ মাস	৭ মাস	৮ মাস	৯ মাস	১০ মাস	১১ মাস	১ বছর	১ মাস	২ মাস	৩ মাস	৪ মাস	৫ মাস	৬ মাস	৭ মাস	৮ মাস	৯ মাস	১০ মাস	১১ মাস	২ বছর	৩ বছর	৪ বছর	৫ বছর	৬ বছর	৭ বছর	৮ বছর	৯ বছর	১০ বছর	১১ বছর	১২ বছর	১৩ বছর
mRNA ভ্যাকসিন নতুন করোনাভাইরাস	অস্থায়ী	□□□	টিকাদানের সময়সূচির পরিবর্তন হতে পারে। আগে থেকে সর্বশেষ তথ্য চেক করুন।																																		
নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন হেপাটাইটিস বি (মায়ের কাছ থেকে সন্তানে সংক্রমণ প্রতিরোধ ছাড়া)	নিয়মিত সময়	□□□	①	②	সাধারণত প্রথমবারের টিকাদানের ৩ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয়বারের টিকা এবং দ্বিতীয়বারের টিকাদানের ৪ সপ্তাহ পরে তৃতীয়বারের টিকাদান করা হয়।																																
লাইভ ভ্যাকসিন রোটাইভাইরাস (মৌখিক টিকা বা ওরাল ভ্যাকসিন)	নিয়মিত সময়	□□□	①	②	③	রোটাইভাইরাসের টিকা এককালীন অথবা ৫ ভাগে ভাগ করে দেয়া যায়। জন্মের কমপক্ষে ১৪ সপ্তাহ ৬ দিনের মধ্যে টিকা গ্রহণ শুরু করে, প্রতিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিকা গ্রহণ করা।																															
নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন মেনিঙ্গোকোকাল (মস্তিষ্কে প্রদাহ সৃষ্টিকারী জীবাণু)	নিয়মিত সময়	□□□□	①	②	③	রোটাইভাইরাস, হেমাফিলাস ইনফলুয়েঞ্জা টাইপ বি, নিউমোকোকাল জীবাণু (ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টিকারী জীবাণু) চার ধরণের মিশ্র টিকার (ডিপথেরিয়া, ছুপিং কাশি, টিটেনাস ও পোলিও) প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিকাদান নীম শেষ করার জন্য যুগপৎ টিকা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ।																															
নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন নিউমোকোকাল জীবাণু (ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টিকারী জীবাণু)	নিয়মিত সময়	□□□□	①	②	③	পার্টিসিস বা ঘুংডি কাশির সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ডিপথেরিয়া, পার্টিসিস ও টিটেনাসের তিন ধরণের মিশ্র টিকা একবার গ্রহণ করতে হবে। (স্বচ্ছায় টিকা গ্রহণ) WHOও এই সময়ের অতিরিক্ত টিকা গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে থাকে।																															
নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন ডিপথেরিয়া, ছুপিং কাশি, টিটেনাস ও পোলিও চার ধরণের মিশ্র টিকা (ডিপটি, DPT-IPV) ডিপথেরিয়া পার্টিসিস ও টিটেনাসের তিন ধরণের মিশ্র টি	নিয়মিত সময়	□□□□	①	②	③	১ বছরের জন্মদিন আসলে, আপনার শিশুকে যুগপৎ টিকা প্রদান করুন। হেমাফিলাস ইনফলুয়েঞ্জা টাইপ বি (শ্বাসনালী এবং ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টিকারী জীবাণু), নিউমোকোকাল জীবাণু চার ধরণের মিশ্র টিকা (ডিপথেরিয়া, ছুপিং কাশি, টিটেনাস ও পোলিও), MR, চিকেন পক্স, মাম্পস বা পনসিকা, এই ছয় ধরণের টিকা যুগপৎভাবে গ্রহণ করা যাবে।																															
লাইভ ভ্যাকসিন বিসিজি (BCG)	নিয়মিত সময়	□	①	বিদেশে সাধারণত ৪ বছরের বেশি বয়সে পোলিও ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। (স্বচ্ছায় টিকা গ্রহণ)																																	
লাইভ ভ্যাকসিন এমআর (MR) (মিজেলস বা হাম এবং রুবেলার মিশ্রণ)	নিয়মিত সময়	□□	কিন্ডারগার্টেন, নার্সারি স্কুলের বছরের পর এপ্রিল-জুন মাস সুপারিশ করা হয়।																																		
লাইভ ভ্যাকসিন চিকেন পক্স	নিয়মিত সময়	□□	①	②	এখনো সংক্রমিত হননি এমন ব্যক্তি দুইবার গ্রহণ করুন। (*)																																
লাইভ ভ্যাকসিন মাম্পস বা পনসিকা	স্বচ্ছায়	□□	①	এখনো সংক্রমিত হননি এমন ব্যক্তি দুইবার গ্রহণ করুন। (*)																																	
নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন জাপানি এনসেফালাইটিস বা মস্তিষ্কপ্রদাহ	নিয়মিত সময়	□□□□	সাধারণত, ৩ বছর থেকে এই টিকাদান শুরু করা হলেও, জন্মের ছয় মাস পরেও এই টিকাদান করা যাবে।																																		
নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন ইনফলুয়েঞ্জা	স্বচ্ছায়	প্রতিটি শরৎকালে	আসুন, আমরা প্রতি বছর, অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের দিকে টিকা গ্রহণ করি।																																		
নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন এইচপিভি (HPV) ২-ভ্যালেন্ট, ৪-ভ্যালেন্ট, ৯-ভ্যালেন্ট (হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস)	নিয়মিত সময়	□□□	ছেলেরা ৪-ভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে পারে। (স্বচ্ছায় টিকা গ্রহণ) ৯-ভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে, প্রথমবারের টিকা ১৫ বছরের কম বয়সে গ্রহণ করা হলে, ২ বা ৩ বার এবং ১৫ বছরের বেশি গ্রহণ করা হলে ৩ বার টিকাদান করা হয়।																																		
নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন মেনিঙ্গোকোকাল জীবাণু	স্বচ্ছায়	□	২ বছর থেকে গ্রহণ করা যাবে। বিদেশে অধ্যয়ন এবং ছাত্রাবাসে বসবাসকারী ব্যক্তিদের গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।																																		
ভ্রমণকালীন টিকা		□	বিদেশে ভ্রমণ করার সময়, উপরেরগুলো ছাড়াও, ইয়েলো ফিভার বা হলুদ জ্বর, হেপাটাইটিস এ, জলাতঙ্ক ইত্যাদির জন্য টিকা গ্রহণ করা। ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্র্যাভেল ক্লিনিক, ইত্যাদির মাধ্যমে টিকাদান সম্পর্কে পরামর্শ নিন।																																		

mRNA ভ্যাকসিন	mRNA ভ্যাকসিন	অস্থায়ী	বিনামূল্যে (সম্পূর্ণরূপে সরকার বহন করবে)।	অস্থায়ী টিকাদানের বয়স	↔	সুপারিশকৃত টিকাদানের সময় (সংখ্যা হ্যাঁ টিকাদানের সংখ্যা / কতবার)	(*)	সংযুক্ত নথিতে তালিকাভুক্ত নয় এমন টিকাদানের সুপারিশ
নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন	নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন	নিয়মিত সময়	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রহণ করা হলে, নীতিগতভাবে বিনামূল্যে গ্রহণ করা যাবে (সরকার বহন করবে)।	রুটিন টিকাদানের জন্য বয়স	↔	সংযুক্ত নথিতে তালিকাভুক্ত নয় এমন টিকাদানের সুপারিশকৃত সময়		
লাইভ ভ্যাকসিন	লাইভ ভ্যাকসিন	স্বচ্ছায়	অধিকাংশ টিকার জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে। স্থানীয় সরকারের উপর নির্ভর করে, সরকারি ভর্তুকির ব্যবস্থা আছে। কোনো ব্যক্তির জন্য স্বচ্ছায় টিকাদান, নিয়মিত টিকাদানের মতোই প্রয়োজনীয়।	স্বচ্ছায় টিকা গ্রহণের বয়স				● বিভিন্ন ধরণের ইনজেকশনের মাধ্যমে নেয়া লাইভ (জীবিত) ভ্যাকসিনের মধ্যকার টিকাদানের বিরাম কাল বা মধ্যবর্তী সময় কমপক্ষে ৪ সপ্তাহ (৪ সপ্তাহ পরে একই দিন থেকে টিকা গ্রহণ করা সম্ভব)।