

لحماية أطفالكم الأجزاء من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، لا بد من الأخذ في الحسبان أن يتم تطعيمهم بمجرد أن يصلوا لعمر مناسب لتلقي كل لقاح. هذا الجدول هو إقتراح لاكتساب مناعة مبكرة، مُقدم من قبل منظمة حماية أطفالنا الغير ربحية. يجب عليك التحدث إلى طبيب الرعاية الأولية لطفلك لوضع جدول تحصين وفقاً لبرنامج التطعيم في منطقتك السكنية وحالة تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاح.

العمر	تم إعطاؤه	اسم اللقاح
0 دون سنة	استثنائي	لقاح كورونا المستجد mRNA
1 سنة واحدة	روتيني	لقاح مضطف التهاب الكبد الوبائي ب (باستثناء الوقاية من العدوى في الفترة ما قبل و بعد الولادة)
1 سنة واحدة	روتيني	لقاح حي فيروس روتا (لقاح فموي)
1 سنة واحدة	روتيني	لقاح مضطف الانفلونزا الدامية من النوع ب
1 سنة واحدة	روتيني	لقاح مضطف المكورات الرئوية المقترن
1 سنة واحدة	روتيني	لقاح مضطف الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال
1 سنة واحدة	روتيني	لقاح حي مرض السبل
1 سنة واحدة	روتيني	لقاح حي MR الحصبة والحصبة الألمانية معاً
1 سنة واحدة	روتيني	لقاح حي مرض الحمق (جدري الماء)
1 سنة واحدة	اختياري	لقاح حي النكاف
1 سنة واحدة	روتيني	لقاح مضطف التهاب الدماغ الياباني
1 سنة واحدة	اختياري	لقاح مضطف الانفلونزا
1 سنة واحدة	روتيني	لقاح مضطف HPV (ثلاثي التكافؤ، رباعي التكافؤ، تساعي التكافؤ) فيروس الورم الحليمي البشري
1 سنة واحدة	اختياري	لقاح مضطف المكورات السحائية
1 سنة واحدة	اختياري	لقاحات للمسافرين

الحصول على التطعيم للمرة الثانية بعد المرة الأولى بـ 3 أسابيع، والمرة الثالثة بعد المرة الثانية بـ 8 أسابيع.

ثلاث جرعات مطلوبة قبل بلوغ السنة. يجب أن تعطى الجرعة الثالثة فاصلاً أربعة إلى خمسة أشهر بعد إعطاء الجرعة الثانية. حتى بالنسبة للأطفال بعمر السنة أو أكثر، يوصى بالتطعيم في أقرب وقت ممكن إذا لم يتم إعطاؤه بعد (تطعيم اختياري).

هناك نوعان من لقاحات فيروس الروتا: اللقاحات أحادية التكافؤ والنوع الثاني خماسية التكافؤ. يجب أن يبدأ التطعيم في موعد لا يتجاوز أربعة عشر أسبوعاً وستة أيام بعد الولادة. ويجب على كل فرد إكمال جميع الجرعات المطلوبة لكل لقاح.

إن التزامن في إعطاء اللقاحات هو مفتاح الإنجاز المبكر للجرعات المطلوبة لكل من فيروس الروتا، الانفلونزا الدامية من النوع ب، المكورات الرئوية المقترنة والدفتيريا، السعال الديكي، وشلل الأطفال المضطف.

عندما يبلغ طفلك عامه الأول، يجب إعطاؤه هذه اللقاحات في نفس اليوم. هذا اللقاح متوفر ويعطى متزامناً مع بعضه البعض كل من لقاح الانفلونزا الدامية من النوع ب، المكورات الرئوية المقترنة، الدفتيريا، الكزاز، السعال الديكي، شلل الأطفال المضطف، الحصبة، الحمق، والنكاف.

يتم إعطاء جرعة واحدة من اللقاح الثلاثي المخصص لكل من الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز، للوقاية من عدوى السعال الديكي (التطعيم اختياري). وكذلك توصي منظمة الصحة العالمية بجرعة إضافية خلال هذه الفترة.

الحصول على جرعتين من التطعيم بفاصل زمني 3 أسابيع (الدفعة الأولى). الدفعة الإضافية من التطعيم تكون بعد مرور 3 أشهر على التطعيم السابق.

عادة ما يتم إعطاء لقاح DPT خارج اليابان (التطعيم اختياري) عادة ما يتم إعطاء لقاح DPT خارج اليابان (التطعيم اختياري) عادة ما يتم إعطاء لقاح DPT خارج اليابان (التطعيم اختياري) عادة ما يتم إعطاء لقاح DPT خارج اليابان (التطعيم اختياري).

يوصى بالتطعيم بين شهري أبريل ويونيو في السنة الثالثة رياض الأطفال أو الحضانة.

يوصى بالتطعيم الثاني للأطفال الذين لم يصابوا بالنكاف مطلقاً. (\*)

تطعيم إضافي عند عمر التسع سنوات. (اللقاح المستهدفة من عمر تسعة إلى اثني عشر سنة)

يوصى بالتطعيم لإطالاب الصف السادس. (اللقاح المستهدفة للتطعيم: الفتيات من الصف السادس إلى العاشر)

في حالة اللقاح تساعي التكافؤ، إذا كانت الجرعة الأولى لمن هم أقل من 15 سنة، فيتم تلقي التطعيم مرتين أو ثلاث مرات، ولمن هم فوق سن 15 سنة يتم تلقي التطعيم 3 مرات.

الذكور يمكنهم تلقي اللقاح رباعي التكافؤ (تطعيم اختياري)

يمكن أن يبدأ التطعيم من عمر سنتين ويوصى به للأطفال الذين سوف يدرسون في الخارج أو الذين يعيشون في مساكن الطلبة

قد يحتاج المسافرون إلى خارج البلاد إلى التطعيم ضد الحمى الصفراء والتهاب الكبد الوبائي أ وداء الكلب بالإضافة إلى التطعيمات المذكورة أعلاه. يجب عليك استشارة عيادة السفر حول الخضوع للتطعيم في أقرب وقت يناسبك بمجرد تأكيد خططك للسفر إلى الخارج.

لقاح mRNA: مجاني (يتم تغطيته بالكامل من الحكومة) | لقاح مضطف: اللقاح الروتيني: بشكل عام مجاني (على حساب الحكومة) إذا تم إعطاؤه خلال المدة المحددة | لقاح حي: اللقاح الاختياري: في الغالب مقابل رسوم (يدفعها الفرد) تقدم بعض البلديات مساعدات لتغطية تكلفتها. اللقاحات الاختياري ضرورية مثل اللقاحات الروتينية.

العمر المستهدف للتطعيم الاستثنائي: العمر المستهدف للتطعيم الاختياري: العمر الذي يمكن فيه إعطاء اللقاحات الاختياري

الفترة الزمنية الموصى بها للتطعيم (\*): الفترة الزمنية الموصى بها للتطعيم غير مكتوبة في نشرة العبوة | الفترة الزمنية الموصى بها للتطعيم غير مكتوبة في نشرة العبوة

تطلب فترة على الأقل أربع أسابيع تكون فاصلة بين حقن اللقاحات المختلفة. (يوفر التطعيم مرة أخرى في نفس اليوم من الأسبوع بعد مرور 4 أسابيع لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا <https://www.know-vpd.jp/>)