

预防接种时间表

为我们宝贵的下一代免受VPD（疫苗可预防的疾病）的侵害，重要的是要尽量在孩子进入接种适龄期的最佳时间内得到预防接种。本时间表是“NPO法人 了解VPD，守护下一代协会”为使孩子尽早获得免疫力而提供的预防接种时间方案。关于您孩子的预防接种，请根据居住地的预防接种信息以及VPD的流行情况信息，请您务必在咨询有关医生的基础上对孩子安排合适的预防接种时间。

疫苗名称	接种完毕	0岁	1岁	2岁	3岁	4岁	5岁	6岁	7岁	8岁	9岁	10岁	11岁	12岁	13岁	(实足年龄)
灭活疫苗 B(乙)型肝炎 (母子感染预防除外)	定期	□□□	①	②	③											
活疫苗 轮状病毒 (口服疫苗)	定期	□□□	①	②	③											
灭活疫苗 HIB	定期	□□□□	①	②	③											
灭活疫苗 小儿用肺炎球菌	定期	□□□□	①	②	③											
灭活疫苗 四联 (DPT-IPV) 三联、脊髓灰质炎	定期	□□□□	①	②	③											
活疫苗 BCG	定期	□														
活疫苗 MR (麻风联苗)	定期	□□														
活疫苗 水痘	定期	□□														
活疫苗 腮腺炎	任意	□□														
灭活疫苗 流行性乙型脑炎	定期	□□□□														
灭活疫苗 流感	任意	每年秋季														
灭活疫苗 HPV (人乳头瘤病毒)	定期	□□□														
灭活疫苗 脑膜炎球菌	任意	□														
旅行疫苗		□														

灭活疫苗 灭活疫苗 **定期** 在规定期间内接种原则上免费 (公费负担)。

活疫苗 活疫苗 **任意** 大部分收费 (自行负担)。部分自治体有公费补助。任意接种疫苗的必要性性与定期接种疫苗并无差异。

定期预防接种的对象年龄

可接受任意接种的年龄

←→ 推荐接种期间 (数字为接种次数)

←○→ 附件资料未记载的推荐接种期间

(*) 附件资料虽未记载, 但推荐接种

● 不同种类的注射活疫苗的接种间隔时间最短需要4周 (4周后的同日以后可以接种)

同时接种: 可同时接种几种疫苗。安全性与单独接种并无差异。日本政府和日本小儿科学会均建议将大腿 (大腿前外侧) 作为婴幼儿的接种部位。详情请咨询有关医生。

详细信息请访问 <http://www.know-vpd.jp/> **VPD** **搜索**