Bersyong ng Abril, 2021

Iskedyul ng pagbabakuna

Upang protektahan ang ating mahahalagang mga anak mula sa VPD (mga sakit na puwedeng iwasan sa pamamagitan ng bakuna), mahalagang huwag malimutang bakunahang ang mga anak sa tamang pagkakataon ayon sa iskedyul. Ang iskedyul na ito ay isang panukala ng samahang “Kodomo wo mamorou no kai (Protect Our Children)” upang mabigyang ang mga bata ng panglaban sa akit sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng pagkilala sa NPO VPD.Para sa pagbabakuna sa inyong mga anak, mangyaring kumonsulta sa inyong doktor upang magtakda ng iskedyul ayon sa pamamaraan ng pagbabakuna at kalagayan ng pagkalat ng VPD sa inyong lugar.

Pangalan ng bakuna	Binakunahan na ☑
Hepatitis B (maliban sa pag-iwas sa paghawang ina-sa-anak) — Inactivated Vaccine — Regular	□□□
Rota Virus (Iniinom na bakuna) — Live Vaccine — Regular	RV 1 □□ / RV 5 □□□
Hiv — Inactivated Vaccine — Regular	□□□□
Pediatric Pneumococcal — Inactivated Vaccine — Regular	□□□□
4 Mixed (DPT-IPV) 3 Mixed・Polio — Inactivated Vaccine — Regular	□□□□
BCG — Live Vaccine — Regular	□
MR (Pinagsamang Tigdas at Rubella) — Live Vaccine — Regular	□□
Bulutong (Varicella) — Live Vaccine — Regular	□□
Beke — Live Vaccine — Opsyonal	□□
Japanese Encephalitis — Inactivated Vaccine — Regular	□□□□
Influenza — Inactivated Vaccine — Opsyonal	Tuwing Taglagas
HPV (Human Papilloma Virus) — Inactivated Vaccine — Regular	□□□
Meningococcal — Inactivated Vaccine — Opsyonal	□
Bakuna para sa travel	□

Edad: 0 Taon, 1 Buwan, 2 Buwan, 3 Buwan, 4 Buwan, 5 Buwan, 6 Buwan, 7 Buwan, 8 Buwan, 9 Buwan, 10 Buwan, 11 Buwan, 1 Taon, 1 Buwan, 2 Buwan, 3 Buwan, 4 Buwan, 5 Buwan, 6 Buwan, 7 Buwan, 8 Buwan, 9 Buwan, 10 Buwan, 11 Buwan, 2 Taon, 3 Taon, 4 Taon, 5 Taon, 6 Taon, 7 Taon, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Kailangan ng 3 beses na pagbabakuna bago mag-isang taon gulang. Babakunahan ng ikatlo 4 hanggang 5 buwan matapos ang ikalawa. Inirerekomendang bakunahan sa lalong madaling panahon kapag hindi pa binabakunahan kahit higit pang isang taong gulang na. (Opsyonal na pagbabakuna)

May RV1 at RV5 ang bakuna laban sa Rota Virus.
Kailangang simulan ang pagbabakuna bago mag-14 linggo at 6 araw matapos ipanganak at bakunahan nang wastong ulit ng bawat uri.

Mahalagang magkasabay na bakunahan para sa Rota Virus, Hiv, Pneumococcal at 4 Mixed upang matapos nang maaga ang kinakailangang ulit ng pagbabakuna.

Upang maiwasang magka-pertussis, babakunahan nang minsan ng 3 Mixed Vaccine. (Opsyonal na pagbabakuna) Inirerekomenda rin ng WHO ang karagdagang pagbabakuna sa panahong ito.

2 Mixed (DT): karagdagang pagbabakuna sa edad na 11 (Target ng pagbabakuna edad na 11-12)

Kung dumating na ang unang kaarawan, bakunahan nang sabay-sabay.
Maaaring mabakunahan nang sabay-sabay ng 6 na uri na Hiv, Pneumococcal, 4 Mixed, MR, Bulutong at Beke.

Karaniwang bakunahan ng Polio vaccine sa edad na 4 pataas sa ibang bansa. (Opsyonal na pagbabakuna)

Karaniwang bakunahan ng 3 Mixed vaccine sa ibang bansa. (Opsyonal na pagbabakuna)

Inirerekomendang bakunahan sa Abril hanggang Hunyo kapag nasa senior sa nursery o kindergarten.

Kapag hindi pa binabakunahan, kailangang bakunahan nang 2 beses. (*)

Karaniwang bakunahan mula sa edad na 3, maaaring bakunahan mula sa edad na 6 na buwan.

Karagdagang pagbabakuna sa edad na 9. (Target ng pagbabakuna edad na 9-12)

Bakunahan sa Oktubre o Nobyembre bawat taon.

Bilang bahagi ng boluntaryong programa ng pagbabakuna, ang mga batang babae ay maaaring makatanggap ng isang 9-valent na bakuna habang ang mga lalaki ay maaaring makatanggap ng isang 4-valent na bakuna

Magpabakuna kapag tumuntong sa grade 6. (Target ng regular na pagbabakuna: Ang mga batang babaeng nasa grade 6-10)

Puwedeng bakunahan mula sa edad na 2. Inirerekomenda ring bakunahan ang mga mag-aaral sa ibang bansa at titira sa dormitoryo.

Kapag pupunta sa labas ng bansa, maaaring kailanganin ang bakuna laban sa Yellow Fever, Hepatitis A at Rabies dagdag pa sa mga nasa itaas. Kumunsulta sa travel clinic at iba pa kapag natiyak ang pagpunta sa ibang bansa sa lalong madaling panahon.

Inactivated Vaccine — Inactivated Vaccine

Live Vaccine — Live Vaccine

Sabay-sabay na pagbabakuna: Maaaring bakunahan ng ilang bakuna nang sabay-sabay.
Hindi naiiba ang kaligtasan nito sa pagbabakuna nang isa-isa. Inirerekomenda rin ng Pambansang pamahalaan at ng Japan Pediatric Society na magbakuna sa hita (itaas na bahagi ng tagilirang hita). Mangyaring magtanong sa inyong doktor para sa mga detalye.

Regular — Libre kapag babakunahan sa itinakdang panahon (pampublikong gastos).

Opsyonal — Karamihan may bayad (sariling gastos). Maaaring may tulong ng pampublikong gastos depende sa lokal na pamahalaan.
Hindi naiiba ang pangangailangan ng bakuna ng opsyonal na pagbabakuna sa bakuna ng regular na pagbabakuna.

Target na edad para sa regular na pagbabakuna

Edad na maaaring bakunahan ng opsyonal na pagbabakuna

Inirerekomendang panahon ng pagbabakuna (ang numero ay ulit ng pagbabakuna)

Inirerekomendang panahon ng pagbabakuna na hindi nakasaad sa nakalakip na dokumento

(*) Kahit hindi nakasaad sa nakalakip na dokumento, inirerekomendang bakunahan

● Ang interval ng pagbabakuna ng ibang uri ng parehong live vaccine ay 4 na linggo o higit pa. (Parehong araw ng linggo matapos ang 4 na linggo.)

Para sa mga detalye http://www.know-vpd.jp/ VPD Hanapin

Ginawa noong Hulyo, 2020

KNOW★VPD! Protect Our Children (NPO)