




Calendrier de vaccination

Pour protéger vos enfants contre les maladies évitables par la vaccination (MEV), il vous importe de ne pas oublier de les faire vacciner dès qu'ils atteignent l'âge indiqué pour chaque vaccin. Ce calendrier est une proposition pour une acquisition précoce de l'immunité, établi par le KNOW★VPD! Protect Our Children (NPO). Vous devriez parler au médecin de soins primaires de votre enfant pour établir un calendrier de vaccination en fonction du programme de vaccination de votre zone résidentielle et de l'état épidémique des MEV.

Nom du vaccin	Administré	0 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	11 ans	12 ans	13 ans	(Âge)
Hépatite B (à l'exclusion de la prévention des infections périnatales)	Routine	<input checked="" type="checkbox"/>														
Rotavirus (vaccin oral)	Routine															
Conjugué pneumococcique	Routine															
DPT-IPV-Hib (Diphtérie, coqueluche, tétanos, polio, Haemophilus influenzae de type b)	Routine															
BCG	Routine															
RR (la rougeole, la rubéole combiné)	Routine															
Varicella (varicelle)	Routine															
Oreillons	Volontaire															
Encéphalite japonaise	Routine															
Covid-19	Volontaire															
Grippe	Volontaire															
HPV (bivalent, quadrivalent, nonavalent) (Papillomavirus humain)	Routine															
Méningocoque	Volontaire															
Vaccins pour les voyageurs																



Vaccin vivant (Routine) Généralement gratuit (aux frais de l'État) si le vaccin est administré pendant la période prescrite.

Vaccin inactivé (Volontaire) Principalement moyennant des frais (payés par l'individu). Certaines municipalités offrent une subvention. Les vaccins volontaires sont aussi nécessaires que les vaccins de Routine.

Vaccin à ARNm

Administration simultanée: Plusieurs vaccins peuvent être administrés le même jour. C'est aussi sûr que les vaccins administrés séparément. Le gouvernement japonais ainsi que la Société japonaise de pédiatrie recommandent la cuisse (la partie extérieure avant de la cuisse) comme site d'inoculation pour les nourrissons et les tout-petits. Consultez le médecin de soins primaires de votre enfant pour des informations plus détaillées.

Âge pour les vaccinations de routine (pink)

Âge pour les vaccinations volontaires (yellow)

● Un intervalle d'au moins 4 semaines est requis entre les injections de différents vaccins vivants. (Vaccination possible le même jour 4 semaines après.)

↔ Période recommandée pour la vaccination (les chiffres indiquent les doses d'une série)

⊖ Période de vaccination recommandée non-indiquée sur la notice

(*) Vaccination recommandée non-indiquée sur la notice

Pour plus d'informations, cliquez sur <https://www.know-vpd.jp/> **VPD** **Cherche**