إصدار أبريل 2025

جدول التطعيمات

لحماية أطفالكم الأعزاء من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، لا بد من الأخذ في الحسبان أن يتم تطعيمهم بمجرد أن يصلو لعمر مناسب لتلقي كل لقاح. هذا الجدول هو اقتراح لاكتساب مناعة مبكرة، مُقدم من قبل
منظمة حماية أطفالنا الغير ربحية. يجب عليك التحدث إلى طبيب الرعاية الأولية لطفلك لوضع جدول تحصين وفقا لبرنامج التطعيم في منطقتك السكنية وحالة تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاح.

اسم اللقاح		تم إعطاؤه ☑	العمر: 0 دون السنة (شهر واحد) – شهران – ثلاثة شهور – أربعة شهور – خمسة شهور – ستة شهور – سبعة شهور – ثمانية شهور – تسعة شهور – عشرة شهور – أحد عشر شهرًا – 1 سنة واحدة (شهر واحد) – شهران – ثلاثة شهور – أربعة شهور – خمسة شهور – ستة شهور – سبعة شهور – ثمانية شهور – تسعة شهور – عشرة شهور – أحد عشر شهرًا – 2 سنتان – 3 ثلاث سنوات – 4 أربع سنوات – 5 خمس سنوات – 6 ست سنوات – 7 سبع سنوات – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13
لقاح مضعّف (التهاب الكبد الوبائي B باستثناء الوقاية من العدوى في الفترة ما قبل و بعد الولادة)	روتيني	□□□	ثلاث جرعات مطلوبة قبل بلوغ السنة. يجب أن تعطى الجرعة الثالثة بفاصل أربعة إلى خمسة أشهر بعد إعطاء الجرعة الثانية. حتى بالنسبة للأطفال بعمر السنة أو أكثر، يوصى بالتطعيم في أقرب وقت ممكن إذا لم يتم إعطاؤه بعد (تطعيم اختياري).
لقاح حي فيروس روتا (لقاح فموي)	روتيني	□□ أحادي التكافؤ □□□ خماسي التكافؤ	هناك نوعان من لقاحات فيروس الروتا. اللقاحات أحادية التكافؤ والنوع الثاني خماسية التكافؤ. يجب أن يبدأ التطعيم في موعد لا يتجاوز أربعة عشر أسبوعا وستة أيام بعد الولادة. ويجب على كل فرد إكمال جميع الجرعات المطلوبة لكل لقاح.
لقاح مضعّف المكورات الرئوية لدى الأطفال	روتيني	□□□□	يتم إعطاء جرعة واحدة من اللقاح الثلاثي المخصص لكل من الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز، للوقاية من عدوى السعال الديكي (التطعيم اختياري). وكذلك توصي منظمة الصحة العالمية بجرعة إضافية خلال هذه الفترة
لقاح مضعّف اللقاح الخماسي المُحَسّن الخناق/ السعال الديكي/ الكزاز/ شلل الأطفال/ الانفلونزا الدامية من النوع ب	روتيني	□□□□	للحصول على العدد المطلوب من التطعيمات، يجب إعطاؤها في نفس الوقت بمجرد بلوغها الشهرين من العمر.
لقاح حي مرض السل	روتيني	□	
لقاح حي MR الحصبة والحصبة الألمانية معاً	روتيني	□□	يوصى بالتطعيم بين شهري أبريل ويونيو في السنة الثالثة رياض الأطفال أو الحضانة
لقاح حي مرض الحماق (جدري الماء)	روتيني	□□	عليك إعطاء طفلك هذه اللقاحات في نفس اليوم عندما يبلغ عامه الأول. يمكن أيضًا وبصورة متزامنة إعطاء لقاحات المكورات الرئوية لدى الأطفال، اللقاح الخماسي المُحَسّن، الحصبة والحصبة الألمانية، الحماق، والنكاف.
لقاح حي النكاف	اختياري	□□	يجب الحصول على هذا التطعيم مرتين من أجل الحصول على مناعة مؤكدة. (*)
لقاح مضعّف التهاب الدماغ الياباني	روتيني	□□□□	وهو متاح كتطعيم روتيني من عمر 6 أشهر.
لقاح mRNA كورونا المستجد	اختياري		جدول إعطاء التطعيمات يختلف وفقًا للسن ونوع التطعيمات. يُرجى التحقق من أحدث المعلومات مسبقًا.
لقاح مضعّف الانفلونزا	اختياري	كل خريف	يوصى بالتطعيم في الفترة ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام.
لقاح مضعّف HPV (ثنائي التكافؤ، رباعي التكافؤ، تساعي التكافؤ) فيروس الورم الحليمي البشري	روتيني	□□□	الذكور يمكنهم تلقي اللقاح رباعي التكافؤ (تطعيم اختياري) في حالة اللقاح تساعي التكافؤ، إذا كانت الجرعة الأولى لمن هم أقل من 15 سنة، فيتم تلقي التطعيم مرتين أو ثلاث مرات، ولمن هم فوق سن 15 سنة يتم تلقي التطعيم 3 مرات يوصى بالتطعيم لطلاب الصف السادس. (الفئة المستهدفة للتطعيم: الفتيات من الصف السادس إلى العاشر)
لقاح مضعّف المكورات السحائية	اختياري	□	يمكن أن يبدأ التطعيم من عمر سنتين ويوصى به للأطفال الذين سوف يدرسون في الخارج أو الذين يعيشون في مساكن الطلبة
لقاحات للمسافرين		□	قد يحتاج المسافرون إلى خارج البلاد إلى التطعيم ضد الحمى الصفراء والتهاب الكبد الوبائي أ وداء الكلب بالإضافة إلى التطعيمات المذكورة أعلاه. يجب عليك استشارة عيادة السفر حول الخضوع للتطعيم في أقرب وقتٍ يناسبك بمجرد تأكيد خططك للسفر إلى الخارج.

عادة ما يتم إعطاء لقاح DPT خارج اليابان (التطعيم اختياري)

DT تطعيم إضافي في سن الأحد عشر عامًا (الفئة المستهدفة من التطعيم في عمر: 11 إلى 12 سنة)

عادة ما يتم إعطاء لقاح شلل الأطفال خارج اليابان من سن أربع سنوات أو أكثر (التطعيم اختياري)

تطعيم إضافي عند عمر التسع سنوات. (الفئة المستهدفة من عمر تسعة إلى اثنتي عشرة سنة)

لقاح حي: روتيني — اللقاح الروتيني: بشكل عام مجاني (على حساب الحكومة) إذا تم إعطاؤه خلال المدة المحددة

لقاح مضعّف: اختياري — اللقاح الاختياري: في الغالب مقابل رسوم (يدفعها الفرد) تقدم بعض البلديات مساعدات لتغطية تكلفتها. اللقاحات الاختياري ضرورية مثل اللقاحات الروتينية.

لقاح mRNA: ● يتطلب فترة على الأقل أربع أسابيع تكون فاصلة بين حقن اللقاحات الحية المختلفة. (يتوفر التطعيم مرة أخرى في نفس اليوم من الأسبوع بعد مرور 4 أسابيع

العمر المستهدف للتطعيم الروتيني

العمر الذي يمكن فيه إعطاء اللقاحات الاختيارية

الفترة الزمنية الموصي بها للتطعيم (تشير الأرقام إلى جرعات متتالية)

الفترة الزمنية الموصى بها التطعيم غير مكتوبة في نشرة العبوة

(*) الفترة الزمنية الموصى بها للتطعيم غير المكتوبة في نشرة العبوة

إعطاء اللقاحات المتزامنة : إعطاء اللقاحات المتزامنة: يمكن إعطاء اللقاحات المتعددة في نفس اليوم. وهذا آمن مثله مثل إعطاء أي لقاحات منفصلة. توصي الحكومة اليابانية وكذلك جمعية طب الأطفال اليابانية باستخدام الفخذ (الجزء الأمامي الخارجي من الفخذ) كموقع لتطعيم الرضع والأطفال الصغار. استشر طبيب الرعاية الأولية الخاص بطفلك للحصول على معلومات أكثر تفصيلا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا https://www.know-vpd.jp/ بحث VPD

حماية أطفالنا (جمعية غير ربحية) VPD! ★تعرف

أعدت في أبريل 2025