



Iskedyul ng pagbabakuna

Upang protektahan ang ating mahalagang mga anak mula sa VPD (mga sakit na puwedeng iwasan sa pamamagitan ng bakuna), mahalagang huwag malimutang bakunahang ang mga anak sa tamang pagkakataon ayon sa iskedyul. Ang iskedyul na ito ay isang panukala ng samahang "Kodomo wo mamorou no kai (Protect Our Children)" upang mabigyang ang mga bata ng panglaban sa akit sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng pagkilala sa NPO VPD. Para sa pagbabakuna sa inyong mga anak, mangyaring kumonsulta sa inyong doktor upang magtakda ng iskedyul ayon sa pamamaraan ng pagbabakuna at kalagayan ng pagkalat ng VPD sa inyong lugar.

Pangalan ng bakuna	Binakunahan na <input checked="" type="checkbox"/>	0												1											2	3	4	5	6	7	8			9			10			11			12			13			Edad
		Taon	1 Buwan	2 Buwan	3 Buwan	4 Buwan	5 Buwan	6 Buwan	7 Buwan	8 Buwan	9 Buwan	10 Buwan	11 Buwan	Taon	1 Buwan	2 Buwan	3 Buwan	4 Buwan	5 Buwan	6 Buwan	7 Buwan	8 Buwan	9 Buwan	10 Buwan	11 Buwan	Taon	Taon	Taon	Taon	Taon	Taon	Taon	Taon	Taon	Taon	Taon	Taon	Taon	Taon										
Hepatitis B (maliban sa pag-iwas sa paghawang ina-sa-anak)	Regular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kailangan ng 3 beses na pagbabakuna bago mag-isang taon gulang. Babakunahan ng ikatlo 4 hanggang 5 buwan matapos ang ikalawa. Inirerekomandang bakunahan sa lalong madaling panahon kapag hindi pa binabakunahan kahit higit pang isang taong gulang na. (Opsyonal na pagbabakuna)																																												
Rota Virus (Iniinom na bakuna)	Regular	RV 1 <input type="checkbox"/> RV 5 <input type="checkbox"/>	1	2	3	May RV1 at RV5 ang bakuna laban sa Rota Virus. Kailangang simulan ang pagbabakuna bago mag-14 linggo at 6 araw matapos ipanganak at bakunahan nang wastong ulit ng bawat uri.																																											
Hiv	Regular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mahalagang magkasabay na bakunahan para sa Rota Virus, Hiv, Pneumococcal at 4 Mixed upang matapos nang maaga ang kinakailangang ulit ng pagbabakuna.																																											
Pediatric Pneumococcal	Regular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Upang maiwasang magka-pertussis, babakunahan nang minsan ng 3 Mixed Vaccine. (Opsyonal na pagbabakuna) Inirerekomenda rin ng WHO ang karagdagang pagbabakuna sa panahong ito.											2 Mixed (DT): karagdagang pagbabakuna sa edad na 11 (Target ng pagbabakuna edad na 11-12)																																
4 Mixed (DPT-IPV) 3 Mixed • Polio	Regular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kung dumating na ang unang kaarawan, bakunahan nang sabay-sabay. Maaaring mabakunahan nang sabay-sabay ng 6 na uri na Hiv, Pneumococcal, 4 Mixed, MR, Bulutong at Beke.											Karaniwang bakunahan ng 3 Mixed vaccine sa edad na 11 (Target ng pagbabakuna edad na 11-12)																																
BCG	Regular	<input type="checkbox"/>	Kailangang magkasabay na bakunahan para sa Rota Virus, Hiv, Pneumococcal at 4 Mixed upang matapos nang maaga ang kinakailangang ulit ng pagbabakuna.											Karaniwang bakunahan ng 3 Mixed vaccine sa edad na 4 pataas sa ibang bansa. (Opsyonal na pagbabakuna)																																			
MR (Pinagsamang Tigdas at Rubella)	Regular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kailangang magkasabay na bakunahan para sa Rota Virus, Hiv, Pneumococcal at 4 Mixed upang matapos nang maaga ang kinakailangang ulit ng pagbabakuna.											Inirerekomandang bakunahan sa Abril hanggang Hunyo kapag nasa senior sa nursery o kindergarten.																																		
Bulutong (Varicella)	Regular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kailangang magkasabay na bakunahan para sa Rota Virus, Hiv, Pneumococcal at 4 Mixed upang matapos nang maaga ang kinakailangang ulit ng pagbabakuna.											Kapag hindi pa binabakunahan, kailangang bakunahan nang 2 beses. (*)																																		
Beke	Opsyonal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kailangang magkasabay na bakunahan para sa Rota Virus, Hiv, Pneumococcal at 4 Mixed upang matapos nang maaga ang kinakailangang ulit ng pagbabakuna.											Kapag hindi pa binabakunahan, kailangang bakunahan nang 2 beses. (*)																																		
Japanese Encephalitis	Regular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Karaniwang bakunahan mula sa edad na 3, maaaring bakunahan mula sa edad na 6 na buwan.											Kapag hindi pa binabakunahan, kailangang bakunahan nang 2 beses. (*)																																
Influenza	Opsyonal	Tuwing Taglagas	Bakunahan sa Oktubre o Nobyembre bawat taon.											Karagdagang pagbabakuna sa edad na 9. (Target ng pagbabakuna edad na 9-12)																																			
HPV (Human Papilloma Virus)	Regular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Magbabakuna kapag tumuntong sa grade 6. (Target ng regular na pagbabakuna: Ang mga batang babaeng nasa grade 6-10)											Inirerekomenda rin ng mga kaugay na organisasyon tulad ng Japan Society of Obstetrics and Gynecology ang pagbabakuna.																																	
Meningococcal	Opsyonal	<input type="checkbox"/>	Puwedeng bakunahan mula sa edad na 2. Inirerekomenda ring bakunahan ang mga mag-aaral sa ibang bansa at titira sa dormitoryo.																																														
Bakuna para sa travel	<input type="checkbox"/>	Kapag pupunta sa labas ng bansa, maaaring kailanganin ang bakuna laban sa Yellow Fever, Hepatitis A at Rabies dagdag pa sa mga nasa itaas. Kumonsulta sa travel clinic at iba pa kapag natiyak ang pagpunta sa ibang bansa sa lalong madaling panahon.																																															

Inactivated Vaccine
Inactivated Vaccine

Live Vaccine
Live Vaccine

Sabay-sabay na pagbabakuna:
Sabay-sabay na pagbabakuna:

Regular Libre kapag babakunahan sa itinakdang panahon (pampublikong gastos).
Karamihan may bayad (sariling gastos). Maaaring may tulong ng pampublikong gastos depende sa lokal na pamahalaan. Hindi naiiba ang pangangailangan ng bakuna ng opsyonal na pagbabakuna sa bakuna ng regular na pagbabakuna.

Opsyonal Maaaring bakunahan ng ilang bakuna nang sabay-sabay. Hindi naiiba ang kaligtasan nito sa pagbabakuna nang isa-isa. Inirerekomenda rin ng Pambansang pamahalaan at ng Japan Pediatric Society na magbakuna sa hita (itaas na bahagi ng tagilirang hita). Mangyaring magtanong sa inyong doktor para sa mga detalye.

Target na edad para sa regular na pagbabakuna

Edad na maaaring bakunahan ng opsyonal na pagbabakuna

Inirerekomandang panahon ng pagbabakuna (ang numero ay ulit ng pagbabakuna)

Inirerekomandang panahon ng pagbabakuna na hindi nakasaad sa nakalalip na dokumento

Kahit hindi nakasaad sa nakalalip na dokumento, inirerekomandang bakunahan

* Ang interval ng pagbabakuna ng ibang uri ng parehong live vaccine ay 4 na linggo o higit pa. (Parehong araw ng linggo matapos ang 4 na linggo.)

Para sa mga detalye <http://www.know-vpd.jp/> **VPD** **Hanapin**